



Personne inconsciente, sans mouvement ou réaction

↓ Vérifier s'il y a du danger ! →

MISV
(cf. chapitre 1.3)

← Demander de l'aide à un collègue




Respiration ?

OUI →


Position latérale
(cf. chapitre 1.6.3)

NON ↓

Donner l'alarme, téléphoner au 144
Aller chercher ou demander le défibrillateur



Commencer la réanimation :
30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations
ou
100 compressions thoraciques à la minute sans insufflation jusqu'à l'arrivée du défibrillateur



Arrivée du défibrillateur
(Philips HeartStart M5066A)



Défibrillable
(Selon indications du défibrillateur)


Rythme ?

(Mesuré automatiquement par le défibrillateur)

Non défibrillable
(Selon indications du défibrillateur)



1 défibrillation



Recommencer immédiatement la réanimation :
30/2 pendant 2 minutes
ou au moins
100 compressions thoraciques sans insufflations



Recommencer immédiatement la réanimation :
30/2 pendant 2 minutes
ou au moins
100 compressions thoraciques sans insufflations
Poursuivre la réanimation jusqu'à l'arrivée des secouristes professionnels ou que le patient bouge

Pour les compressions thoraciques, placer les mains au centre de la poitrine entre les seins (ligne mammaire).




Bras droit à 90° au-dessus de la victime.




La profondeur des compressions doit être d'au moins de 5 cm.

Informations complémentaires pour la position des électrodes.

Placement des électrodes sur les adultes et les enfants de plus de 25 kilos ou âgés de plus de 8 ans.



Placement des électrodes sur les nouveau-nés ou enfants de moins de 25 kilos ou âgés de moins de 8 ans.



- ♦ Retirer tout patch médical et/ou adhésif de la poitrine du patient avant d'appliquer les électrodes. Utilisez le rasoir si le torse est poilu.
- ♦ Les électrodes ne doivent pas se toucher, ni toucher des parties métalliques en contact avec le patient.
- ♦ Ne placer pas les électrodes directement sur un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté. L'endroit de l'implant est signalé par une grosseur visible sous la peau et une cicatrice chirurgicale.