


1.2 La chaîne de survie

La chaîne de survie définit le déroulement de l'organisation en vue de couvrir les différents événements qui surviennent au quotidien. Elle regroupe les mesures nécessaires au déploiement des ressources et au transport des patients vers l'hôpital. La chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible – si l'un des maillons est faible ou absent, les chances de survie diminuent d'autant.



Les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque diminuent de 10% à chaque minute écoulée sans défibrillation. Au bout de 10 minutes, les chances de survie sont inférieures à 10%.

Les actions à mener sont les suivantes :

Aide d'urgence

Mesures immédiates pour sauver la vie (Observer, réfléchir, agir) cf. chapitre 1.3

Appel d'urgence 144

Appeler des professionnels, s'informer par téléphone des mesures d'urgence à appliquer.

Premiers secours non-professionnels

Mesures de base, position, hémostase (cf. chapitre 1.6), (BLS-AED)

Transport

Transport d'urgence ; ambulance ou hélicoptère médicalisé.

Hôpital

Traitement. Service des urgences, salle d'opération, soins intensifs.

1.3 Comportement général

Mesures immédiates pour sauver la vie



♦ Observer

Qui ? Quelles sont les personnes impliquées ?
Quoi ? De quel type d'accident s'agit-il ?
Où ? Dans quel endroit l'accident s'est-il passé et dans quel milieu ?
Combien ? Quel est le nombre de blessés, quelle est la nature des blessures ?
Autres observations ?

♦ Réfléchir

Y a-t-il des dangers immédiats ?

- Pour les sauveteurs ?
- Pour les victimes ?
- Pour d'autres personnes ?

♦ Agir

Protéger le lieu de l'accident
Mettre les patients à l'abri
Secourir

Prise en charge psychologique d'une personne (patient)

La règle des 4P :

- ☑ Présentez-vous
- ☑ Pratiquez l'écoute active (empathie, attitude compréhensive, observation)
- ☑ Posez prudemment une main (prendre sa main...)
- ☑ Protéger le patient (protection thermique et/ou psychologique)

1.4 Evaluation de l'état du patient

L'état de conscience et les signes de vie spontanés du patient déterminent les mesures à prendre.

Contrôle de l'état de conscience

- ♦ Parler au patient à haute voix
- ♦ Réaction à la douleur en pinçant le dos de la main

Conscient si

- ♦ Répond à des questions simples
- ♦ Réagit à la douleur (plaintes, gémissements)
- ♦ Peut ouvrir les yeux